

Adults Need Immunization Too!

Recommended Adult Vaccines in PEI

VACCINE	Adults 18-64	Adults 65 and over	[†] High Risk Groups	How can I get this vaccine?
Haemophilus Influenzae Type B (HIB)			✓	By referral from a health care provider to public health nursing (PHN)
Hepatitis A Vaccine			✓	By referral from a health care provider to PHN
Hepatitis B Vaccine			✓	By referral from a health care provider to PHN
Herpes Zoster (Shingles) Vaccine ¹	✓ (60 and over)	✓		Contact your health care provider or pharmacist
Human Papillomavirus (HPV) Vaccine			✓	Contact PHN
Influenza (Flu) Vaccine ²	✓	✓	✓	Check the website every fall http://www.gov.pe.ca/flu
Measles, Mumps, Rubella (MMR) Vaccine ³	✓			Contact PHN
Meningococcal (Men-C-ACWY) Vaccine			✓	By referral from a health care provider to PHN
Pneumococcal Conjugate (Pneu-C-13) Vaccine			✓	By referral from a health care provider to PHN
Pneumococcal Polysaccharide (Pneu-P- 23) Vaccine		✓	✓	By referral from a health care provider to PHN
Tetanus and Diphtheria (Td) Vaccine ⁴	✓	✓	✓	Contact PHN
Tetanus, Diphtheria, Pertussis (Tdap) Vaccine ⁵	✓	✓	✓	Contact PHN
Varicella (Chickenpox) Vaccine ⁶	✓			Contact PHN

Note: All vaccines are free of charge unless otherwise noted below. For questions please speak with your health care provider, pharmacist or Health PEI Public Health Nursing. Travelers should consult with a travel clinic. Certain occupations such as health care workers and those who work with animals should consult with their employer.

[†]High Risk Groups: Individuals with certain risk conditions or factors including those with chronic diseases, weakened immune systems or lifestyle risk factors such as smoking.

¹Shingles vaccine is recommended for adults aged 60 and over however, it is not free in PEI.

²Annual influenza immunization is recommended for all adults, especially people at high risk of serious illness from influenza. An administration fee may apply.

³Individuals born in 1970 or later who have not been immunized or had the disease(s) require 1 or 2 doses depending on the situation. Adults born prior to 1970 are considered to be immune however, there are exceptions.

^{4 5}A booster dose of the Td vaccine is recommended every 10 years for all adults with one lifetime dose being Tdap.

⁶Most adults in PEI have immunity to chickenpox however, some individuals such as household contacts of immunocompromised people should be tested for immunity or be immunized.

Les adultes aussi ont besoin d'immunisation!

Vaccins recommandés pour les adultes à l'I.-P.-É.

VACCIN	Adultes de 18 à 64 ans	Adultes de 65 ans et plus	† Groupes à risque élevé Groups	Comment puis-je obtenir ce vaccin?
Haemophilus influenzae de type b (HIB)			✓	Sur recommandation d'un fournisseur de soins de santé au personnel infirmier public
Hépatite A			✓	Sur recommandation d'un fournisseur de soins de santé au personnel infirmier public
Hépatite B			✓	Sur recommandation d'un fournisseur de soins de santé au personnel infirmier public
Zona (bardeaux) ¹	✓ (60 ans et plus)	✓		Communiquez avec votre personnel infirmier public ou votre pharmacien.
Papillomavirus			✓	Communiquez avec le personnel infirmier public.
Influenza (grippe) ²	✓	✓	✓	Consultez le site Web chaque automne http://www.gov.pe.ca/flu
Rougeole, oreillons, rubéole (ROR) ³	✓			Communiquez avec le personnel infirmier public.
Vaccin antiméningococcique (Men-C-ACWY)			✓	Sur recommandation d'un fournisseur de soins de santé au personnel infirmier public
Pneumocoque - vaccin conjugué (Pneu-C-13)			✓	Sur recommandation d'un fournisseur de soins de santé au personnel infirmier public
Vaccin antipneumococcique (Pneu-P- 23)		✓	✓	Sur recommandation d'un fournisseur de soins de santé au personnel infirmier public
Tétanos et diphtérie (Td) ⁴	✓	✓	✓	Communiquez avec le personnel infirmier public.
Tétanos, diphtérie, coqueluche (Tdc) ⁵	✓	✓	✓	Communiquez avec le personnel infirmier public.
Varicelle ⁶	✓			Communiquez avec le personnel infirmier public.

À noter : Tous les vaccins sont offerts gratuitement à moins d'avis contraire. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé, votre pharmacien ou le personnel infirmier de santé publique de Santé I.-P.-É. Les voyageurs devraient consulter une clinique du voyageur. Les gens de certaines professions comme les travailleurs en soins de santé et ceux qui travaillent avec les animaux devraient consulter leur employeur.

† Groupes à risqué élevé : Les individus qui souffrent de certaines conditions, y compris maladies chroniques, système immunitaire affaibli ou facteurs de risque liés au style de vie, tel que le fumage.

¹Le vaccin contre le zona est recommandé pour les adultes de 60 ans et plus; cependant, il n'est pas gratuit à l'I.-P.-É.

²L'immunisation annuelle contre la grippe est recommandée pour les adultes, surtout les gens dont le risque de contracter une maladie

grave aux suites de la grippe est élevé. Des frais d'administration pourraient s'appliquer.³grave aux suites de la grippe est élevé. Des frais d'administration pourraient s'appliquer.

³Les personnes nées en 1970 ou plus tard qui n'ont pas été immunisées ou qui ont contracté la maladie auront besoin d'une ou deux doses, selon la situation. Les adultes nés avant 1970 sont considérées immunisées; cependant, il peut y avoir des exceptions.

⁴⁵Une injection de rappel du vaccin Td est recommandée tous les dix ans pour tous les adultes, alors que pour le Tdc, c'est une dose à vie.

⁶La plupart des adultes à l'I.-P.-É. sont immunisés contre la varicelle; cependant, certaines personnes comme les contacts familiaux des personnes immunodéficientes devraient envisager de faire tester ou immuniser.